

Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.723	34

		Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh?	Bakteri Tuberkulosis sering disebut sebagai bakteri tahan asam karena ?	ciri-ciri bakteri tuberkulosis yang benar adalah ?	Bakteri tuberkulosis paling sering berada di bagian apeks paru, karena bakteri ini bersifat?	Berdasarkan pilihan dibawah ini yang merupakan tuberkulosis ekstra paru adalah ?	Dibawah ini yang termasuk dalam kategori pasien dengan pengobatan sebelumnya adalah?	Apa yang dimaksud dengan MDR-TB (multi-drug resistant tuberculosis)?	Tuberkulosis ditransmisikan melalui?	Berdasarkan poin diatas gejala khas yang timbul pada orang dengan TB positif adalah?	Sei imun apa yang bekerja saat bakteri pertama kali menginvasi?
Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a 32	. ^a 32	. ^a 32	. ^a 32	. ^a 32	. ^a 32	. ^a 32	. ^a 32	. ^a 32	. ^a 32
Bakteri Tuberkulosis sering disebut sebagai bakteri tahan asam karena ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a 32	1 32	-.333 .062 32	.098 .595 32	-.033 .860 32	-.113 .537 32	-.314 .080 32	-.077 .674 32	.157 .391 32	-.077 .674 32
ciri-ciri bakteri tuberkulosis yang benar adalah ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a 32	-.333 .062 32	1 32	.293 .104 32	.098 .595 32	.081 .660 32	.163 .374 32	.232 .202 32	-.028 .880 32	.232 .202 32
Bakteri tuberkulosis paling sering berada di bagian apeks paru, karena bakteri ini bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a 32	.098 .595 32	.293 .104 32	1 32	.238 .189 32	-.024 .898 32	-.048 .796 32	-.068 .712 32	.203 .266 32	-.068 .712 32
Berdasarkan pilihan dibawah ini yang merupakan tuberkulosis ekstra paru adalah ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a 32	-.033 .860 32	.098 .595 32	.238 .189 32	1 32	.323 .071 32	.397 .025 32	-.158 .387 32	-.284 .116 32	-.158 .387 32
Dibawah ini yang termasuk dalam kategori pasien dengan pengobatan sebelumnya adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a 32	-.113 .537 32	.081 .660 32	-.024 .898 32	.323 .071 32	1 32	.434 .013 32	-.191 .295 32	-.128 .487 32	-.191 .295 32
Apa yang dimaksud dengan MDR-TB (multi-drug resistant tuberculosis)?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a 32	-.314 .080 32	.163 .374 32	-.048 .796 32	.397 .025 32	.434 .013 32	1 32	-.204 .264 32	-.149 .417 32	-.204 .264 32

		Berdasarkan poin diatas, apabila pada pemeriksaan dahak ditemukan hasil BTA (+ -) maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan menurut DEPKES adalah?	Uji yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi M. tuberculosis adalah?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam tujuan pemeriksaan biakan pada tuberculosis adalah?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam pemeriksaan penunjang adalah ?	Berdasarkan poin diatas yang tergolong obat lini pertama untuk pasien TB adalah?	Obat lini kedua untuk pasien TB adalah?	Pemberian OAT juga memiliki efek samping yang berbahaya salah satunya adalah Streptomisin yang dapat menyebabkan ?	Efek samping OAT yang menyebabkan nyeri sendi dan terkadang serangan arthritis gout adalah?	Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberculosis adalah?	Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?
Penyakit tuberculosis disebabkan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32
Bakteri Tuberculosis sering disebut sebagai bakteri tahan asam karena ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.051 .782 32	.600 .000 32	-.138 .450 32	.141 .442 32	.189 .301 32	-.059 .747 32	-.086 .640 32	.157 .391 32	. . 32	.488 .005 32
Ciri-ciri bakteri tuberculosis yang benar adalah ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.017 .926 32	-.200 .272 32	.415 .018 32	-.033 .860 32	.059 .750 32	.307 .087 32	.129 .481 32	-.028 .880 32	. . 32	-.163 .374 32
Bakteri tuberculosis paling sering berada di bagian apeks paru, karena bakteri ini bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.075 .685 32	-.098 .595 32	-.122 .507 32	-.143 .435 32	.486 .005 32	.213 .242 32	-.189 .300 32	.203 .266 32	. . 32	.048 .796 32
Berdasarkan pilihan dibawah ini yang merupakan tuberculosis ekstra paru adalah ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.025 .893 32	.033 .860 32	-.068 .713 32	.111 .545 32	.295 .101 32	.055 .764 32	.000 1.000 32	-.068 .713 32	. . 32	.238 .189 32
Dibawah ini yang termasuk dalam kategori pasien dengan pengobatan sebelumnya adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.111 .544 32	.243 .181 32	.087 .635 32	.197 .279 32	.194 .287 32	.004 .983 32	.063 .733 32	.087 .635 32	. . 32	.197 .279 32
Apa yang dimaksud dengan MDR-TB (multi-drug resistant tuberculosis)?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.157 .389 32	-.293 .104 32	.284 .116 32	.397 .025 32	.162 .376 32	.323 .071 32	.252 .164 32	-.149 .417 32	. . 32	.016 .931 32

		Berapa lama waktu inkubasi bakteri dalam membentuk koloni globular?	Berdasarkan poin diatas penyebaran bakteri tuberculosis dapat terjadi secara?	Gumpalan bakteri hidup akan disebut sebagai?	Kompleks Chon yang menjadi nekrotik akan tampak seperti?	Nekrosis kaseosa disebut juga sebagai?	Gambaran paru-paru pasien TB akan tampak seperti?	Penyebab kematian paling umum pada pasien TB disebabkan oleh?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dari faktor risiko tuberculosis adalah?	Pemeriksaan dahak mikroskopis yang dilakukan pada pasien suspek TB adalah?	Pemeriksaan SPS adalah?
Penyakit tuberculosis disebabkan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32	. . 32
Bakteri Tuberculosis sering disebut sebagai bakteri tahan asam karena ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.050 .787 32	.005 .976 32	.289 .109 32	.022 .904 32	.358 .044 32	.289 .109 32	.244 .178 32	.305 .090 32	-.077 .674 32	.244 .178 32
Ciri-ciri bakteri tuberculosis yang benar adalah ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.298 .097 32	.378 .033 32	-.156 .395 32	.333 .062 32	-.098 .595 32	.022 .904 32	.067 .717 32	.233 .199 32	.232 .202 32	.067 .717 32
Bakteri tuberculosis paling sering berada di bagian apeks paru, karena bakteri ini bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.000 1.000 32	.120 .512 32	-.163 .374 32	.098 .595 32	.429 .014 32	-.163 .374 32	.293 .104 32	-.026 .887 32	-.068 .712 32	-.098 .595 32
Berdasarkan pilihan dibawah ini yang merupakan tuberculosis ekstra paru adalah ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.073 .692 32	-.168 .357 32	.141 .442 32	.488 .005 32	.429 .014 32	-.380 .032 32	.033 .860 32	.289 .109 32	.204 .264 32	-.228 .210 32
Dibawah ini yang termasuk dalam kategori pasien dengan pengobatan sebelumnya adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.181 .322 32	.371 .037 32	-.113 .537 32	.081 .660 32	-.024 .898 32	-.286 .113 32	.243 .181 32	.309 .085 32	.169 .356 32	-.275 .128 32
Apa yang dimaksud dengan MDR-TB (multi-drug resistant tuberculosis)?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.218 .230 32	.040 .828 32	.033 .860 32	.423 .016 32	.143 .435 32	-.314 .080 32	-.033 .860 32	.131 .474 32	.158 .387 32	-.293 .104 32

		Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberculosis adalah?	Tujuan dari strategi pemerintah adalah?	Upaya Kesehatan perorangan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TB adalah?	Total
Penyakit tuberculosis disebabkan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a . 32	. ^a . 32	. ^a . 32	. ^a . 32	. ^a . 32
Bakteri Tuberculosis sering disebut sebagai bakteri tahan asam karena ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.130 .477 32	.052 .778 32	-.138 .450 32	-.138 .450 32	.224 .218 32
ciri-ciri bakteri tuberculosis yang benar adalah ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.391 [*] .027 32	-.156 .395 32	-.249 .169 32	.415 [*] .018 32	.412 [*] .019 32
Bakteri tuberculosis paling sering berada di bagian apeks paru, karena bakteri ini bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.522 ^{**} .002 32	.098 .595 32	-.122 .507 32	.203 .266 32	.318 .076 32
Berdasarkan pilihan dibawah ini yang merupakan tuberculosis ekstra paru adalah ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.290 .107 32	-.033 .860 32	.149 .417 32	-.068 .713 32	.400 [*] .023 32
Dibawah ini yang termasuk dalam kategori pasien dengan pengobatan sebelumnya adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.021 .911 32	-.286 .113 32	.302 .093 32	-.128 .487 32	.331 .064 32
Apa yang dimaksud dengan MDR-TB (multi-drug resistant tuberculosis)?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.373 [*] .035 32	.380 [*] .032 32	.068 .713 32	-.149 .417 32	.472 ^{**} .006 32

		Berapa lama waktu inkubasi bakteri dalam membentuk koloni globular?	Berdasarkan poin diatas penyebaran bakteri tuberculosis dapat terjadi secara?	Gumpalan bakteri hidup akan disebut sebagai?	Kompleks Ghon yang menjadi nekrotik akan tampak seperti?	Nekrosis kaseosa disebut juga sebagai?	Gambaran paru-paru pasien TB akan tampak seperti?	Penyebab kematian paling umum pada pasien TB disebabkan oleh?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dari faktor risiko tuberculosis adalah?	Pemeriksaan dahak mikroskopis yang dilakukan pada pasien suspek TB adalah?	Pemeriksaan SPS adalah?
Tuberculosis ditransmisikan melalui?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.104 .572 32	.149 .417 32	-.077 .674 32	-.139 .448 32	-.068 .712 32	-.077 .674 32	-.046 .801 32	-.112 .540 32	-.032 .861 32	-.046 .801 32
Berdasarkan poin diatas gejala khas yang timbul pada orang dengan TB positif adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.062 .736 32	-.171 .351 32	.452 ^{**} .009 32	-.028 .880 32	-.122 .507 32	-.138 .450 32	-.083 .651 32	.037 .840 32	-.058 .753 32	.360 .043 32
Sel imun apa yang bekerja saat bakteri pertama kali menginvasi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.104 .572 32	.149 .417 32	-.077 .674 32	.232 .202 32	-.068 .712 32	.417 [*] .017 32	-.046 .801 32	-.112 .540 32	-.032 .861 32	.696 ^{**} .000 32
Berapa lama waktu inkubasi bakteri dalam membentuk koloni globular?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .314 32	.184 .051 32	.348 .051 32	.298 .097 32	-.218 .230 32	.149 .415 32	-.149 .415 32	.120 .512 32	-.104 .572 32	-.149 .415 32
Berdasarkan poin diatas penyebaran bakteri tuberculosis dapat terjadi secara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.184 .314 32	1 .353 32	-.170 .353 32	-.016 .929 32	-.072 .695 32	.181 .322 32	.214 .241 32	.234 .197 32	-.217 .233 32	-.049 .789 32
Gumpalan bakteri hidup akan disebut sebagai?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.348 .051 32	-.170 .353 32	1 .353 32	.378 .033 32	.098 .595 32	-.185 .310 32	-.111 .545 32	.305 .090 32	-.077 .674 32	.244 .178 32
Kompleks Ghon yang menjadi nekrotik akan tampak seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.298 .097 32	-.016 .929 32	.378 .033 32	1 .033 32	.293 .104 32	.022 .904 32	.067 .717 32	.377 [*] .033 32	.232 .202 32	.067 .717 32

		Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh?	Bakteri Tuberkulosis sering disebut sebagai bakteri tahan asam karena ?	ciri-ciri bakteri tuberkulosis yang benar adalah ?	Bakteri tuberkulosis paling sering berada di bagian apeks paru, karena bakteri ini bersifat?	Berdasarkan pilihan dibawah ini yang merupakan tuberkulosis ekstra paru adalah ?	Dibawah ini yang termasuk dalam kategori pasien dengan pengobatan sebelumnya adalah?	Apa yang dimaksud dengan MDR-TB (multi-drug resistant tuberculosis)?	Tuberkulosis ditransmisika n melalui?	Berdasarkan poin diatas gejala khas yang timbul pada orang dengan TB positif adalah?	Sel imun apa yang bekerja saat bakteri pertama kali menginvasi?
Tuberkulosis ditransmisikan melalui?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a . 32	-.077 .674 32	.232 .202 32	-.068 .712 32	-.158 .387 32	-.191 .295 32	-.204 .264 32	1 32	-.058 .753 32	-.032 .861 32
Berdasarkan poin diatas gejala khas yang timbul pada orang dengan TB positif adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a . 32	.157 .391 32	-.028 .880 32	.203 .266 32	-.284 .116 32	-.128 .487 32	-.149 .417 32	-.058 .753 32	1 32	-.058 .753 32
Sel imun apa yang bekerja saat bakteri pertama kali menginvasi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a . 32	-.077 .674 32	.232 .202 32	-.068 .712 32	-.158 .387 32	-.191 .295 32	-.204 .264 32	-.032 .861 32	-.058 .753 32	1 32
Berapa lama waktu inkubasi bakteri dalam membentuk koloni globular?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a . 32	-.050 .787 32	.298 .097 32	.000 1.000 32	.073 .692 32	-.181 .322 32	.218 .230 32	-.104 .572 32	.062 .736 32	-.104 .572 32
Berdasarkan poin diatas penyebaran bakteri tuberkulosis dapat terjadi secara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a . 32	.005 .976 32	.378 .033 32	.120 .512 32	-.168 .357 32	.371 .037 32	.040 .828 32	.149 .417 32	-.171 .351 32	.149 .417 32
Gumpalan bakteri hidup akan disebut sebagai?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a . 32	.289 .109 32	-.156 .395 32	-.163 .374 32	.141 .442 32	-.113 .537 32	.033 .860 32	-.077 .674 32	.452 .009 32	-.077 .674 32
Kompleks Ghon yang menjadi nekrotik akan tampak seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a . 32	.022 .904 32	.333 .062 32	.098 .595 32	.488 .005 32	.081 .660 32	.423 .016 32	-.139 .448 32	-.028 .880 32	.232 .202 32

		Berdasarkan poin diatas, apabila pada pemeriksaan dahak ditemukan hasil BTA (+ - -) maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan menurut DEPKES adalah?	Uji yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi M. tuberculosis adalah?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam tujuan pemeriksaan biakan pada tuberkulosis adalah?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam pemeriksaan penunjang adalah ?	Berdasarkan poin diatas yang tergolong obat lini pertama untuk pasien TB adalah?	Obat lini kedua untuk pasien TB adalah?	Pemberian OAT juga memiliki efek samping yang berbahaya salah satunya adalah Streptomisin yang dapat menyebabkan ?	Efek samping OAT yang menyebabkan nyeri sendi dan terkadang serangan arthritis gout adalah?	Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberculosis adalah?	Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?
Tuberkulosis ditransmisikan melalui?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.130 .478 32	-.046 .801 32	-.058 .753 32	-.158 .387 32	-.095 .605 32	.191 .295 32	.180 .325 32	-.058 .753 32	. ^a . 32	.204 .264 32
Berdasarkan poin diatas gejala khas yang timbul pada orang dengan TB positif adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.233 .200 32	-.083 .651 32	-.103 .573 32	.149 .417 32	.348 .051 32	.128 .487 32	.107 .559 32	.632 .000 32	. ^a . 32	.149 .417 32
Sel imun apa yang bekerja saat bakteri pertama kali menginvasi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.248 .171 32	-.046 .801 32	-.058 .753 32	.204 .264 32	-.095 .605 32	.191 .295 32	.180 .325 32	-.058 .753 32	. ^a . 32	-.158 .387 32
Berapa lama waktu inkubasi bakteri dalam membentuk koloni globular?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.038 .836 32	-.149 .415 32	.062 .736 32	.073 .692 32	-.131 .475 32	.036 .844 32	.000 1.000 32	.062 .736 32	. ^a . 32	.073 .692 32
Berdasarkan poin diatas penyebaran bakteri tuberkulosis dapat terjadi secara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.071 .699 32	.214 .241 32	.048 .795 32	.088 .631 32	.130 .479 32	.267 .140 32	.064 .729 32	.048 .795 32	. ^a . 32	.088 .631 32
Gumpalan bakteri hidup akan disebut sebagai?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.232 .201 32	.244 .178 32	-.138 .450 32	.488 .005 32	.189 .301 32	.113 .537 32	.258 .154 32	.452 .009 32	. ^a . 32	.314 .080 32
Kompleks Ghon yang menjadi nekrotik akan tampak seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.255 .159 32	.067 .717 32	.194 .288 32	.488 .005 32	.371 .037 32	.307 .087 32	.258 .154 32	.194 .288 32	. ^a . 32	.228 .210 32

		Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberculosis adalah?	Tujuan dari strategi pemerintah adalah?	Upaya Kesehatan perorangan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TB adalah?	Total
Tuberkulosis ditransmisikan melalui?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.130 .478 32	-.077 .674 32	-.058 .753 32	-.058 .753 32	-.049 .792 32
Berdasarkan poin diatas gejala khas yang timbul pada orang dengan TB positif adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.007 .969 32	.157 .391 32	-.103 .573 32	-.103 .573 32	.204 .262 32
Sel imun apa yang bekerja saat bakteri pertama kali menginvasi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.130 .478 32	-.077 .674 32	-.058 .753 32	.558** .001 32	.085 .645 32
Berapa lama waktu inkubasi bakteri dalam membentuk koloni globular?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.190 .298 32	.149 .415 32	.062 .736 32	.309 .085 32	.290 .108 32
Berdasarkan poin diatas penyebaran bakteri tuberkulosis dapat terjadi secara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.197 .280 32	-.170 .353 32	.048 .795 32	.266 .141 32	.381 .032 32
Gumpalan bakteri hidup akan disebut sebagai?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.130 .477 32	.052 .778 32	.157 .391 32	-.138 .450 32	.373 .036 32
Kompleks Ghon yang menjadi nekrotik akan tampak seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.119 .517 32	.200 .272 32	-.028 .880 32	-.028 .880 32	.668* .000 32

		Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh?	Bakteri Tuberkulosis sering disebut sebagai bakteri tahan asam karena ?	ciri-ciri bakteri tuberkulosis yang benar adalah ?	Bakteri tuberkulosis paling sering berada di bagian apeks paru, karena bakteri ini bersifat?	Berdasarkan pilihan dibawah ini yang merupakan tuberkulosis ekstra paru adalah ?	Dibawah ini yang termasuk dalam kategori pasien dengan pengobatan sebelumnya adalah?	Apa yang dimaksud dengan MDR-TB (multi-drug resistant tuberculosis)?	Tuberkulosis ditransmisika n melalui?	Berdasarkan poin diatas gejala khas yang timbul pada orang dengan TB positif adalah?	Sel imun apa yang bekerja saat bakteri pertama kali menginvasi?
Nekrosis kaseosa disebut juga sebagai?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.358* .044 32	-.098 .595 32	.429 .014 32	.429 .014 32	-.024 .898 32	.143 .435 32	-.068 .712 32	-.122 .507 32	-.068 .712 32	
Gambaran paru-paru pasien TB akan tampak seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.289 .109 32	.022 .904 32	-.163 .374 32	-.380 .032 32	-.286 .113 32	-.314 .080 32	-.077 .674 32	-.138 .450 32	.417 .017 32	
Penyebab kematian paling umum pada pasien TB disebabkan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.244 .178 32	.067 .717 32	.293 .104 32	.033 .860 32	.243 .181 32	-.033 .860 32	-.046 .801 32	-.083 .651 32	-.046 .801 32	
Berdasarkan poin diatas yang termasuk dari faktor risiko tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.305 .090 32	.233 .199 32	-.026 .887 32	.289 .109 32	.309 .085 32	.131 .474 32	-.112 .540 32	.037 .840 32	-.112 .540 32	
Pemeriksaan dahak mikroskopis yang dilakukan pada pasien suspek TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.077* .674 32	.232 .202 32	-.068 .712 32	.204 .264 32	.169 .356 32	.158 .387 32	-.032 .861 32	-.058 .753 32	-.032 .861 32	
Pemeriksaan SPS adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.244 .178 32	.067 .717 32	-.098 .595 32	-.228 .210 32	-.275 .128 32	-.293 .104 32	-.046 .801 32	.360 .043 32	.696* .000 32	

		Berapa lama waktu inkubasi bakteri dalam membentuk koloni globular?	Berdasarkan poin diatas penyebaran bakteri tuberkulosis dapat terjadi secara?	Campulan bakteri hidup akan disebut sebagai?	Kompleks Ghon yang menjadi nekrotik akan tampak seperti?	Nekrosis kaseosa disebut juga sebagai?	Gambaran paru-paru pasien TB akan tampak seperti?	Penyebab kematian paling umum pada pasien TB disebabkan oleh?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dari faktor risiko tuberkulosis adalah?	Pemeriksaan dahak mikroskopis yang dilakukan pada pasien suspek TB adalah?	Pemeriksaan SPS adalah?
Nekrosis kaseosa disebut juga sebagai?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.218 .230 32	-.072 .695 32	.098 .595 32	.293 .104 32	1 .374 32	-.163 .374 32	.293 .104 32	.184 .314 32	-.068 .712 32	-.098 .595 32
Gambaran paru-paru pasien TB akan tampak seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.149 .415 32	.181 .322 32	-.185 .310 32	.022 .904 32	-.163 .374 32	1 .374 32	.244 .178 32	-.078 .672 32	-.077 .674 32	.244 .178 32
Penyebab kematian paling umum pada pasien TB disebabkan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.149 .415 32	.214 .241 32	-.111 .545 32	.067 .717 32	.293 .104 32	.244 .178 32	1 .493 32	.126 .493 32	-.046 .801 32	-.067 .717 32
Berdasarkan poin diatas yang termasuk dari faktor risiko tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.120 .512 32	.234 .197 32	.305 .090 32	.377 .033 32	.184 .314 32	-.078 .672 32	.126 .493 32	1 .493 32	.287 .111 32	.126 .493 32
Pemeriksaan dahak mikroskopis yang dilakukan pada pasien suspek TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.104 .572 32	-.217 .233 32	-.077 .674 32	.232 .202 32	-.068 .712 32	-.077 .674 32	-.046 .801 32	.287 .111 32	1 32	-.046 .801 32
Pemeriksaan SPS adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.149 .415 32	-.049 .789 32	.244 .178 32	.067 .717 32	-.098 .595 32	.244 .178 32	-.067 .717 32	.126 .493 32	-.046 .801 32	1 32

		Berdasarkan poin diatas, apabila pada pemeriksaan dahak ditemukan hasil BTA (+/-) maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan menurut DEPKES adalah?	Uji yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi M. tuberculosis adalah?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam tujuan pemeriksaan biakan pada tuberkulosis adalah?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam pemeriksaan penunjang adalah ?	Berdasarkan poin diatas yang tergolong obat lini pertama untuk pasien TB adalah?	Obat lini kedua untuk pasien TB adalah?	Pemberian OAT juga memiliki efek samping yang berbahaya salah satunya adalah Streptomisin yang dapat menyebabkan n ?	Efek samping OAT yang menyebabkan nyeri sendi dan terkadang serangan arthritis gout adalah?	Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis adalah?	Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?
Nekrosis kaseosa disebut juga sebagai?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.124 .498 32	.293 .104 32	-.122 .507 32	.048 .796 32	.486 .005 32	.213 .242 32	.000 1.000 32	.203 .266 32	. . 32	.238 .189 32
Gambaran paru-paru pasien TB akan tampak seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.232 .201 32	.244 .178 32	.157 .391 32	-.206 .258 32	-.228 .210 32	-.059 .747 32	-.086 .640 32	-.138 .450 32	. . 32	-.033 .860 32
Penyebab kematian paling umum pada pasien TB disebabkan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.085 .644 32	.467 .007 32	-.083 .651 32	-.228 .210 32	.176 .336 32	.016 .930 32	.258 .154 32	-.083 .651 32	. . 32	.293 .104 32
Berdasarkan poin diatas yang termasuk dari faktor risiko tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.279 .122 32	.126 .493 32	.276 .127 32	.289 .109 32	.173 .343 32	.109 .553 32	.209 .252 32	.037 .840 32	. . 32	.429 .014 32
Pemeriksaan dahak mikroskopis yang dilakukan pada pasien suspek TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.130 .478 32	-.046 .801 32	.558 .001 32	-.158 .387 32	-.095 .605 32	-.169 .356 32	.180 .325 32	-.058 .753 32	. . 32	.204 .264 32
Pemeriksaan SPS adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.085 .644 32	-.067 .717 32	-.083 .651 32	.293 .104 32	-.137 .456 32	.275 .128 32	.258 .154 32	-.083 .651 32	. . 32	.033 .860 32

		Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberculosis adalah?	Tujuan dari strategi pemerintah adalah?	Upaya Kesehatan perorangan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TB adalah?	Total
Nekrosis kaseosa disebut juga sebagai?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.323 .071 32	.358 .044 32	-.122 .507 32	-.122 .507 32	.388 .028 32
Gambaran paru-paru pasien TB akan tampak seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.130 .477 32	.052 .778 32	-.138 .450 32	.157 .391 32	-.074 .688 32
Penyebab kematian paling umum pada pasien TB disebabkan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.085 .644 32	-.111 .545 32	-.083 .651 32	-.083 .651 32	.249 .169 32
Berdasarkan poin diatas yang termasuk dari faktor risiko tuberculosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.160 .382 32	-.269 .136 32	.037 .840 32	-.201 .270 32	.483** .005 32
Pemeriksaan dahak mikroskopis yang dilakukan pada pasien suspek TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.130 .478 32	-.077 .674 32	-.058 .753 32	-.058 .753 32	.129 .482 32
Pemeriksaan SPS adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.187 .306 32	-.111 .545 32	-.083 .651 32	.360* .043 32	.122 .508 32

		Penyakit tuberculosis disebabkan oleh?	Bakteri Tuberculosis sering disebut sebagai bakteri tahan asam karena ?	ciri-ciri bakteri tuberculosis yang benar adalah ?	Bakteri tuberculosis paling sering berada di bagian apeks paru, karena bakteri ini bersifat?	Berdasarkan pilihan dibawah ini yang merupakan tuberculosis ekstra paru adalah ?	Dibawah ini yang termasuk dalam kategori pasien dengan pengobatan sebelumnya adalah?	Apa yang dimaksud dengan MDR-TB (multi-drug resistant tuberculosis)?	Tuberculosis ditransmisikan melalui?	Berdasarkan poin diatas gejala khas yang timbul pada orang dengan TB positif adalah?	Sel imun apa yang bekerja saat bakteri pertama kali menginvasi?
Berdasarkan poin diatas, apabila pada pemeriksaan dahak ditemukan hasil BTA (+ - -) maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan menurut DEPKES adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.8 . 32	-.051 .782 32	.017 .926 32	-.075 .685 32	-.025 .893 32	.111 .544 32	.157 .389 32	.130 .478 32	.233 .200 32	-.248 .171 32
Uji yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi M. tuberculosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.8 . 32	.600** .000 32	-.200 .272 32	-.098 .595 32	.033 .860 32	.243 .181 32	-.293 .104 32	-.046 .801 32	-.083 .651 32	-.046 .801 32
Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam tujuan pemeriksaan biakan pada tuberculosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.8 . 32	-.138 .450 32	.415 .018 32	-.122 .507 32	-.068 .713 32	.087 .635 32	.284 .116 32	-.058 .753 32	-.103 .573 32	-.058 .753 32
Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam pemeriksaan penunjang adalah ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.8 . 32	.141 .442 32	-.033 .860 32	-.143 .435 32	.111 .545 32	.197 .279 32	.397 .025 32	-.158 .387 32	.149 .417 32	.204 .264 32
Berdasarkan poin diatas yang tergolong obat lini pertama untuk pasien TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.8 . 32	.189 .301 32	.059 .750 32	.486** .005 32	.295 .101 32	.194 .287 32	.162 .376 32	-.095 .605 32	.348 .051 32	-.095 .605 32
Obat lini kedua untuk pasien TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.8 . 32	-.059 .747 32	.307 .087 32	.213 .242 32	.055 .764 32	.004 .983 32	.323 .071 32	.191 .295 32	.128 .487 32	.191 .295 32

		Berapa lama waktu inkubasi bakteri dalam membentuk koloni globular?	Berdasarkan poin diatas penyebaran bakteri tuberkulosis dapat terjadi secara?	Gumpalan bakteri akan disebut sebagai?	Kompleks Ghon yang menjadi nekrotik akan tampak seperti?	Nekrosis kaseosa disebut juga sebagai?	Gambaran paru-paru pasien TB akan tampak seperti?	Penyebab kematian paling umum pada pasien TB disebabkan oleh?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dari faktor risiko tuberkulosis adalah?	Pemeriksaan dahak mikroskopis yang dilakukan pada pasien suspek TB adalah?	Pemeriksaan SPS adalah?
Berdasarkan poin diatas, apabila pada pemeriksaan dahak ditemukan hasil BTA (+ - -) maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan menurut DEPKES adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.038 .836 32	.071 .699 32	-.232 .201 32	-.255 .159 32	-.124 .498 32	-.232 .201 32	-.085 .644 32	-.279 .122 32	.130 .478 32	-.085 .644 32
Uji yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi M. tuberculosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.149 .415 32	.214 .241 32	-.244 .178 32	.067 .717 32	.293 .104 32	.244 .178 32	.467 .007 32	.126 .493 32	-.046 .801 32	-.067 .717 32
Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam tujuan pemeriksaan biakan pada tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.062 .736 32	.048 .795 32	-.138 .450 32	.194 .288 32	-.122 .507 32	.157 .391 32	-.083 .651 32	.276 .127 32	.558 .001 32	-.083 .651 32
Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam pemeriksaan penunjang adalah ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.073 .692 32	.088 .631 32	.488 .005 32	.488 .005 32	.048 .796 32	-.206 .258 32	-.228 .210 32	.289 .109 32	-.158 .387 32	.293 .104 32
Berdasarkan poin diatas yang tergolong obat lini pertama untuk pasien TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.131 .475 32	.130 .479 32	.189 .301 32	.371 .037 32	.486 .005 32	-.228 .210 32	.176 .336 32	.173 .343 32	-.095 .605 32	-.137 .456 32
Obat lini kedua untuk pasien TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.036 .844 32	.267 .140 32	.113 .537 32	.307 .087 32	.213 .242 32	-.059 .747 32	.016 .930 32	.109 .553 32	-.169 .356 32	.275 .128 32

		Berdasarkan poin diatas, apabila pada pemeriksaan dahak ditemukan hasil BTA (+ - -) maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan menurut DEPKES adalah?	Uji yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi M. tuberculosis adalah?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam tujuan pemeriksaan biakan pada tuberkulosis adalah?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam pemeriksaan penunjang adalah ?	Berdasarkan poin diatas yang tergolong obat lini pertama untuk pasien TB adalah?	Obat lini kedua untuk pasien TB adalah?	Pemberian OAT juga memiliki efek samping yang berbahaya salah satunya adalah Streptomisin yang dapat menyebabkan n ?	Efek samping OAT yang menyebabkan nyeri sendi dan terkadang serangan arthritis gout adalah?	Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis adalah?	Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?
Berdasarkan poin diatas, apabila pada pemeriksaan dahak ditemukan hasil BTA (+ - -) maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan menurut DEPKES adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .644 32	-.085 .644 32	.007 .969 32	-.157 .389 32	.065 .725 32	.152 .405 32	.197 .279 32	.007 .969 32	. . 32	.108 .557 32
Uji yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi M. tuberculosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.085 .644 32	1 .644 32	-.083 .651 32	.033 .860 32	.176 .336 32	-.243 .181 32	.000 1.000 32	.360 .043 32	. . 32	.293 .104 32
Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam tujuan pemeriksaan biakan pada tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.007 .969 32	-.083 .651 32	1 .651 32	-.068 .713 32	-.170 .352 32	-.087 .635 32	-.107 .559 32	-.103 .573 32	. . 32	-.068 .713 32
Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam pemeriksaan penunjang adalah ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.157 .389 32	.033 .860 32	-.068 .713 32	1 .713 32	.143 .435 32	.434 .013 32	.378 .033 32	.149 .417 32	. . 32	.111 .545 32
Berdasarkan poin diatas yang tergolong obat lini pertama untuk pasien TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.065 .725 32	.176 .336 32	-.170 .352 32	.143 .435 32	1 .435 32	.109 .553 32	-.076 .681 32	.608 .000 32	. . 32	.295 .101 32
Obat lini kedua untuk pasien TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.152 .405 32	-.243 .181 32	-.087 .635 32	.434 .013 32	.109 .553 32	1 .553 32	.564 .001 32	-.087 .635 32	. . 32	.055 .764 32

		Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberkulosis adalah?	Tujuan dari strategi pemerintah adalah?	Upaya Kesehatan perorangan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TB adalah?	Total
Berdasarkan poin diatas, apabila pada pemeriksaan dahak ditemukan hasil BTA (+ – –) maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan menurut DEPKES adalah?	Pearson Correlation	.247	.311	.007	.007	.147
	Sig. (2-tailed)	.173	.083	.969	.969	.423
	N	32	32	32	32	32
Uji yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi M. tuberculosis adalah?	Pearson Correlation	-.187	-.111	-.083	-.083	.185
	Sig. (2-tailed)	.306	.545	.651	.651	.310
	N	32	32	32	32	32
Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam tujuan pemeriksaan biakan pada tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation	-.007	.157	-.103	-.103	.125
	Sig. (2-tailed)	.969	.391	.573	.573	.496
	N	32	32	32	32	32
Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam pemeriksaan penunjang adalah ?	Pearson Correlation	-.108	.141	.149	-.068	.477**
	Sig. (2-tailed)	.557	.442	.417	.713	.006
	N	32	32	32	32	32
Berdasarkan poin diatas yang tergolong obat lini pertama untuk pasien TB adalah?	Pearson Correlation	.413*	.189	-.170	-.170	.510**
	Sig. (2-tailed)	.019	.301	.352	.352	.003
	N	32	32	32	32	32
Obat lini kedua untuk pasien TB adalah?	Pearson Correlation	.375*	.286	.128	-.087	.566**
	Sig. (2-tailed)	.034	.113	.487	.635	.001
	N	32	32	32	32	32

		Berapa lama waktu inkubasi bakteri dalam membentuk koloni globular?	Berdasarkan poin diatas penyebaran bakteri tuberkulosis dapat terjadi secara?	Cumplan bakteri hidup akan disebut sebagai?	Kompleks Ghon yang menjadi nekrotik akan tampak seperti?	Nekrosis kaseosa disebut juga sebagai?	Gambaran paru-paru pasien TB akan tampak seperti?	Penyebab kematian paling umum pada pasien TB disebabkan oleh?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dari faktor risiko tuberkulosis adalah?	Pemeriksaan dahak mikroskopis yang dilakukan pada pasien suspek TB adalah?	Pemeriksaan SPS adalah?
Pemberian OAT juga memiliki efek samping yang berbahaya salah satunya adalah Streptomisin yang dapat menyebabkan ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.000 1.000 32	.064 .729 32	.258 .154 32	.258 .154 32	.000 1.000 32	-.086 .640 32	.258 .154 32	.209 .252 32	.180 .325 32	.258 .154 32
Efek samping OAT yang menyebabkan nyeri sendi dan terkadang serangan arthritis gout adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.062 .736 32	.048 .795 32	.452** .009 32	.194 .288 32	.203 .266 32	-.138 .450 32	-.083 .651 32	.037 .840 32	-.058 .753 32	-.083 .651 32
Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32
Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.073 .692 32	.088 .631 32	.314 .080 32	.228 .210 32	.238 .189 32	-.033 .860 32	.293 .104 32	.429* .014 32	.204 .264 32	.033 .860 32
Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.190 .298 32	.197 .280 32	-.130 .477 32	.119 .517 32	.323 .071 32	-.130 .477 32	.085 .644 32	-.160 .382 32	-.130 .478 32	-.187 .306 32
Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.149 .415 32	-.170 .353 32	.052 .778 32	.200 .272 32	.358 .044 32	.052 .778 32	-.111 .545 32	-.269 .136 32	-.077 .674 32	-.111 .545 32

		Berdasarkan poin diatas, apabila pada pemeriksaan dahak ditemukan hasil BTA (+ - -) maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan menurut DEPKES adalah?	Uji yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi M. tuberculosis adalah?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam tujuan pemeriksaan biakan pada tuberkulosis adalah?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam pemeriksaan penunjang adalah ?	Berdasarkan poin diatas yang tergolong obat lini pertama untuk pasien TB adalah?	Obat lini kedua untuk pasien TB adalah?	Pemberian OAT juga memiliki efek samping yang berbahaya salah satunya adalah Streptomisin yang dapat menyebabkan ?	Efek samping OAT yang menyebabkan n nyeri sendi dan terkadang serangan arthritis gout adalah?	Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis adalah?	Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?
Pemberian OAT juga memiliki efek samping yang berbahaya salah satunya adalah Streptomisin yang dapat menyebabkan ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.197 .279 32	.000 1.000 32	-.107 .559 32	.378* .033 32	-.076 .681 32	.564** .001 32	1 32	-.107 .559 32	.3 32	.252 .164 32
Efek samping OAT yang menyebabkan nyeri sendi dan terkadang serangan arthritis gout adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.007 .969 32	.360* .043 32	-.103 .573 32	.149 .417 32	.608** .000 32	-.087 .635 32	-.107 .559 32	1 32	.3 32	.149 .417 32
Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 .3 32	.3 32	.3 32
Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.108 .557 32	.293 .104 32	-.068 .713 32	.111 .545 32	.295 .101 32	.055 .764 32	.252 .164 32	.149 .417 32	.3 32	1 32
Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.247 .173 32	-.187 .306 32	-.007 .969 32	-.108 .557 32	.413 .019 32	.375* .034 32	-.066 .721 32	-.007 .969 32	.3 32	-.108 .557 32
Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.311 .083 32	-.111 .545 32	.157 .391 32	.141 .442 32	.189 .301 32	.286 .113 32	.086 .640 32	.157 .391 32	.3 32	.141 .442 32

		Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberkulosis adalah?	Tujuan dari strategi pemerintah adalah?	Upaya Kesehatan perorangan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TB adalah?	Total
Pemberian OAT juga memiliki efek samping yang berbahaya salah satunya adalah Streptomisin yang dapat menyebabkan ?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.066 .721 32	.086 .640 32	.107 .559 32	-.107 .559 32	.440 .012 32
Efek samping OAT yang menyebabkan nyeri sendi dan terkadang serangan arthritis gout adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.007 .969 32	.157 .391 32	-.103 .573 32	-.103 .573 32	.284 .115 32
Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. .32	. 32	. 32	. 32	. 32
Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.108 .557 32	.141 .442 32	.365 .040 32	-.284 .116 32	.509** .003 32
Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .019 32	.413* .019 32	-.007 .969 32	.219 .229 32	.422* .016 32
Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.413* .019 32	1 32	.157 .391 32	-.138 .450 32	.309 .085 32

		Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh?	Bakteri Tuberkulosis sering disebut sebagai bakteri tahan asam karena ?	ciri-ciri bakteri tuberkulosis yang benar adalah ?	Bakteri tuberkulosis paling sering berada di bagian apeks paru, karena bakteri ini bersifat?	Berdasarkan pilihan dibawah ini yang merupakan tuberkulosis ekstra paru adalah ?	Dibawah ini yang termasuk dalam kategori pasien dengan pengobatan sebelumnya adalah?	Apa yang dimaksud dengan MDR-TB (multi-drug resistant tuberculosis)?	Tuberkulosis ditransmisikan melalui?	Berdasarkan poin diatas gejala khas yang timbul pada orang dengan TB positif adalah?	Sei imun apa yang bekerja saat bakteri pertama kali menginvasi?
Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. .488** 32	. .005 32	-.163 .374 32	.048 .796 32	.238 .189 32	.197 .279 32	.016 .931 32	.204 .264 32	.149 .417 32	-.158 .387 32
Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. .130 32	. .477 32	-.391 .027 32	.522* .002 32	.290 .107 32	.021 .911 32	.373 .035 32	-.130 .478 32	-.007 .969 32	-.130 .478 32
Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. .052 32	. .778 32	-.156 .395 32	.098 .595 32	-.033 .860 32	-.286 .113 32	.380 .032 32	-.077 .674 32	.157 .391 32	-.077 .674 32
Tujuan dari strategi pemerintah adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. .138 32	. .450 32	-.249 .169 32	-.122 .507 32	.149 .417 32	.302 .093 32	.068 .713 32	-.058 .753 32	-.103 .573 32	-.058 .753 32
Upaya Kesehatan perorangan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. .138 32	. .450 32	.415* .018 32	.203 .266 32	-.068 .713 32	-.128 .487 32	-.149 .417 32	-.058 .753 32	-.103 .573 32	.558** .001 32
Total	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. .224 32	. .218 32	.412 .019 32	.318 .076 32	.400* .023 32	.331 .064 32	.472** .006 32	-.049 .792 32	.204 .262 32	.085 .645 32

		Berapa lama waktu inkubasi bakteri dalam membentuk koloni globular?	Berdasarkan poin diatas penyebaran bakteri tuberkulosis dapat terjadi secara?	Gumpalan bakteri hidup akan disebut sebagai?	Kompleks Ghon yang menjadi nekrotik akan tampak seperti?	Nekrosis kaseosa disebut juga sebagai?	Gambaran paru-paru pasien TB akan tampak seperti?	Penyebab kematian paling umum pada pasien TB disebabkan oleh?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dari faktor risiko tuberkulosis adalah?	Pemeriksaan dahak mikroskopis yang dilakukan pada pasien suspek TB adalah?	Pemeriksaan SPS adalah?
Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.073 .692 32	.088 .631 32	.314 .080 32	.228 .210 32	.238 .189 32	-.033 .860 32	.293 .104 32	.429 .014 32	.204 .264 32	.033 .860 32
Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.190 .298 32	.197 .280 32	-.130 .477 32	.119 .517 32	.323 .071 32	-.130 .477 32	.085 .644 32	-.160 .382 32	-.130 .478 32	-.187 .306 32
Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.149 .415 32	-.170 .353 32	.052 .778 32	.200 .272 32	.358 .044 32	.052 .778 32	-.111 .545 32	-.269 .136 32	-.077 .674 32	-.111 .545 32
Tujuan dari strategi pemerintah adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.062 .736 32	.048 .795 32	.157 .391 32	-.028 .880 32	-.122 .507 32	-.138 .450 32	-.083 .651 32	.037 .840 32	-.058 .753 32	-.083 .651 32
Upaya Kesehatan perorangan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.309 .085 32	.266 .141 32	-.138 .450 32	-.028 .880 32	-.122 .507 32	.157 .391 32	-.083 .651 32	-.201 .270 32	-.058 .753 32	.360 .043 32
Total	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.290 .108 32	.381 .032 32	.373 .036 32	.668 .000 32	.388 .028 32	-.074 .688 32	.249 .169 32	.483 .005 32	.129 .482 32	.122 .508 32

		Berdasarkan poin diatas, apabila pada pemeriksaan dahak ditemukan hasil BTA (+ + - -) maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan menurut DEPKES adalah?	Uji yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi M. tuberculosis adalah?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam tujuan pemeriksaan biakan pada tuberkulosis adalah?	Berdasarkan poin diatas yang termasuk dalam pemeriksaan penunjang adalah ?	Berdasarkan poin diatas yang tergolong obat lini pertama untuk pasien TB adalah?	Obat lini kedua untuk pasien TB adalah?	Pemberian OAT juga memiliki efek samping yang berbahaya salah satunya adalah Streptomisin yang dapat menyebabkan n ?	Efek samping OAT yang menyebabkan nyeri sendi dan terdapat serangan arthritis gout adalah?	Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis adalah?	Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?
Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.108 .557 32	.293 .104 32	-.068 .713 32	.111 .545 32	.295 .101 32	.055 .764 32	.252 .164 32	.149 .417 32	. .32	1 32
Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.247 .173 32	-.187 .306 32	-.007 .969 32	-.108 .557 32	.413 .019 32	.375 .034 32	-.066 .721 32	-.007 .969 32	. .32	-.108 .557 32
Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.311 .083 32	-.111 .545 32	.157 .391 32	.141 .442 32	.189 .301 32	.286 .113 32	.086 .640 32	.157 .391 32	. .32	.141 .442 32
Tujuan dari strategi pemerintah adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.007 .969 32	-.083 .651 32	-.103 .573 32	.149 .417 32	-.170 .352 32	.128 .487 32	.107 .559 32	-.103 .573 32	. .32	.365 .040 32
Upaya Kesehatan perorangan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TB adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.007 .969 32	-.083 .651 32	-.103 .573 32	-.068 .713 32	-.170 .352 32	-.087 .635 32	-.107 .559 32	-.103 .573 32	. .32	-.284 .116 32
Total	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.147 .423 32	.185 .310 32	.125 .496 32	.477 .006 32	.510 .003 32	.566 .001 32	.440 .012 32	.284 .115 32	. .32	.509 .003 32

		Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberkulosis adalah?	Tujuan dari strategi pemerintah adalah?	Upaya Kesehatan perorangan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TB adalah?	Total
Setelah 2-3 minggu pemberian vaksin, jaringan sekitar akan merespon dengan membentuk?	Pearson Correlation	-.108	.141	.365*	-.284	.509**
	Sig. (2-tailed)	.557	.442	.040	.116	.003
	N	32	32	32	32	32
Vaksin BCG pertama kali diberikan sejak usia?	Pearson Correlation	1	.413*	-.007	.219	.422*
	Sig. (2-tailed)		.019	.969	.229	.016
	N	32	32	32	32	32
Strategi program yang dilakukan di Indonesia untuk memberantas tuberkulosis adalah?	Pearson Correlation	.413*	1	.157	-.138	.309
	Sig. (2-tailed)	.019		.391	.450	.085
	N	32	32	32	32	32
Tujuan dari strategi pemerintah adalah?	Pearson Correlation	-.007	.157	1	-.103	.125
	Sig. (2-tailed)	.969	.391		.573	.496
	N	32	32	32	32	32
Upaya Kesehatan perorangan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TB adalah?	Pearson Correlation	.219	-.138	-.103	1	.046
	Sig. (2-tailed)	.229	.450	.573		.805
	N	32	32	32	32	32
Total	Pearson Correlation	.422*	.309	.125	.046	1
	Sig. (2-tailed)	.016	.085	.496	.805	
	N	32	32	32	32	32

Hasil uji *Chi-Square*

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
angkatan * nilai	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%

angkatan * nilai Crosstabulation

			nilai			Total
			kurang	cukup	baik	
angkatan	2017	Count	5	18	22	45
		Expected Count	12.1	16.5	16.5	45.0
		% within angkatan	11.1%	40.0%	48.9%	100.0%
	2018	Count	4	14	21	39
		Expected Count	10.5	14.3	14.3	39.0
		% within angkatan	10.3%	35.9%	53.8%	100.0%
	2019	Count	24	13	2	39
		Expected Count	10.5	14.3	14.3	39.0
		% within angkatan	61.5%	33.3%	5.1%	100.0%
Total	Count	33	45	45	123	
	Expected Count	33.0	45.0	45.0	123.0	
	% within angkatan	26.8%	36.6%	36.6%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	35.475 ^a	6	.000	.000		
Likelihood Ratio	37.771	6	.000	.000		
Fisher's Exact Test	34.156			.000		
Linear-by-Linear Association	25.007 ^b	1	.000	.000	.000	.000
N of Valid Cases	123					

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.61.

b. The standardized statistic is 5.001.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	41.497 ^a	4	.000	.000		
Likelihood Ratio	44.729	4	.000	.000		
Fisher's Exact Test	42.595			.000		
Linear-by-Linear Association	27.994 ^b	1	.000	.000	.000	.000
N of Valid Cases	123					

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.46.

b. The standardized statistic is -5.291.

status_pekerjaan * nilai Crosstabulation

			nilai			Total
			kurang	cukup	baik	
status_pekerjaan	bekerja	Count	1	5	2	8
		Expected Count	2.1	2.9	2.9	8.0
		% within status_pekerjaan	12.5%	62.5%	25.0%	100.0%
	tidak bekerja	Count	32	40	43	115
		Expected Count	30.9	42.1	42.1	115.0
		% within status_pekerjaan	27.8%	34.8%	37.4%	100.0%
	Total	Count	33	45	45	123
		Expected Count	33.0	45.0	45.0	123.0
		% within status_pekerjaan	26.8%	36.6%	36.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	2.539 ^a	2	.281	.351		
Likelihood Ratio	2.471	2	.291	.422		
Fisher's Exact Test	2.127			.422		
Linear-by-Linear Association	.010 ^b	1	.919	1.000	.554	.179
N of Valid Cases	123					

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.15.

b. The standardized statistic is -.101.

Hasil uji Tiap soal

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Angkatan * soal_1	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_2	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_3	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_4	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_5	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_6	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_7	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_8	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_9	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_10	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_11	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_12	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_13	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%
Angkatan * soal_14	123	100.0%	0	0.0%	123	100.0%

Crosstab

			soal_1		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	24	21	45
		Expected Count	23.4	21.6	45.0
		% within Angkatan	53.3%	46.7%	100.0%
	2018	Count	25	14	39
		Expected Count	20.3	18.7	39.0
		% within Angkatan	64.1%	35.9%	100.0%
	2019	Count	15	24	39
		Expected Count	20.3	18.7	39.0
		% within Angkatan	38.5%	61.5%	100.0%
Total	Count	64	59	123	
	Expected Count	64.0	59.0	123.0	
	% within Angkatan	52.0%	48.0%	100.0%	

Crosstab

			soal_2		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	19	26	45
		Expected Count	18.3	26.7	45.0
		% within Angkatan	42.2%	57.8%	100.0%
	2018	Count	19	20	39
		Expected Count	15.9	23.1	39.0
		% within Angkatan	48.7%	51.3%	100.0%
	2019	Count	12	27	39
		Expected Count	15.9	23.1	39.0
		% within Angkatan	30.8%	69.2%	100.0%
Total	Count	50	73	123	
	Expected Count	50.0	73.0	123.0	
	% within Angkatan	40.7%	59.3%	100.0%	

Crosstab

			soal_3		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	29	16	45
		Expected Count	24.9	20.1	45.0
		% within Angkatan	64.4%	35.6%	100.0%
	2018	Count	26	13	39
		Expected Count	21.6	17.4	39.0
		% within Angkatan	66.7%	33.3%	100.0%
	2019	Count	13	26	39
		Expected Count	21.6	17.4	39.0
		% within Angkatan	33.3%	66.7%	100.0%
Total	Count	68	55	123	
	Expected Count	68.0	55.0	123.0	
	% within Angkatan	55.3%	44.7%	100.0%	

Crosstab

			soal_4		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	36	9	45
		Expected Count	31.1	13.9	45.0
		% within Angkatan	80.0%	20.0%	100.0%
	2018	Count	29	10	39
		Expected Count	27.0	12.0	39.0
		% within Angkatan	74.4%	25.6%	100.0%
	2019	Count	20	19	39
		Expected Count	27.0	12.0	39.0
		% within Angkatan	51.3%	48.7%	100.0%
Total	Count	85	38	123	
	Expected Count	85.0	38.0	123.0	
	% within Angkatan	69.1%	30.9%	100.0%	

Crosstab

			soal_5		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	41	4	45
		Expected Count	38.8	6.2	45.0
		% within Angkatan	91.1%	8.9%	100.0%
	2018	Count	35	4	39
		Expected Count	33.6	5.4	39.0
		% within Angkatan	89.7%	10.3%	100.0%
	2019	Count	30	9	39
		Expected Count	33.6	5.4	39.0
		% within Angkatan	76.9%	23.1%	100.0%
Total	Count	106	17	123	
	Expected Count	106.0	17.0	123.0	
	% within Angkatan	86.2%	13.8%	100.0%	

Crosstab

			soal_6		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	35	10	45
		Expected Count	30.7	14.3	45.0
		% within Angkatan	77.8%	22.2%	100.0%
	2018	Count	36	3	39
		Expected Count	26.6	12.4	39.0
		% within Angkatan	92.3%	7.7%	100.0%
	2019	Count	13	26	39
		Expected Count	26.6	12.4	39.0
		% within Angkatan	33.3%	66.7%	100.0%
Total	Count	84	39	123	
	Expected Count	84.0	39.0	123.0	
	% within Angkatan	68.3%	31.7%	100.0%	

Crosstab

			soal_7		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	43	2	45
		Expected Count	38.0	7.0	45.0
		% within Angkatan	95.6%	4.4%	100.0%
	2018	Count	39	0	39
		Expected Count	33.0	6.0	39.0
		% within Angkatan	100.0%	0.0%	100.0%
	2019	Count	22	17	39
		Expected Count	33.0	6.0	39.0
		% within Angkatan	56.4%	43.6%	100.0%
Total	Count	104	19	123	
	Expected Count	104.0	19.0	123.0	
	% within Angkatan	84.6%	15.4%	100.0%	

Crosstab

			soal_8		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	25	20	45
		Expected Count	25.2	19.8	45.0
		% within Angkatan	55.6%	44.4%	100.0%
	2018	Count	24	15	39
		Expected Count	21.9	17.1	39.0
		% within Angkatan	61.5%	38.5%	100.0%
	2019	Count	20	19	39
		Expected Count	21.9	17.1	39.0
		% within Angkatan	51.3%	48.7%	100.0%
Total	Count	69	54	123	
	Expected Count	69.0	54.0	123.0	
	% within Angkatan	56.1%	43.9%	100.0%	

Crosstab

			soal_9		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	38	7	45
		Expected Count	30.7	14.3	45.0
		% within Angkatan	84.4%	15.6%	100.0%
	2018	Count	30	9	39
		Expected Count	26.6	12.4	39.0
		% within Angkatan	76.9%	23.1%	100.0%
	2019	Count	16	23	39
		Expected Count	26.6	12.4	39.0
		% within Angkatan	41.0%	59.0%	100.0%
Total	Count	84	39	123	
	Expected Count	84.0	39.0	123.0	
	% within Angkatan	68.3%	31.7%	100.0%	

Crosstab

			soal_10		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	28	17	45
		Expected Count	28.2	16.8	45.0
		% within Angkatan	62.2%	37.8%	100.0%
	2018	Count	26	13	39
		Expected Count	24.4	14.6	39.0
		% within Angkatan	66.7%	33.3%	100.0%
	2019	Count	23	16	39
		Expected Count	24.4	14.6	39.0
		% within Angkatan	59.0%	41.0%	100.0%
Total	Count	77	46	123	
	Expected Count	77.0	46.0	123.0	
	% within Angkatan	62.6%	37.4%	100.0%	

Crosstab

			soal_11		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	37	8	45
		Expected Count	31.1	13.9	45.0
		% within Angkatan	82.2%	17.8%	100.0%
	2018	Count	31	8	39
		Expected Count	27.0	12.0	39.0
		% within Angkatan	79.5%	20.5%	100.0%
	2019	Count	17	22	39
		Expected Count	27.0	12.0	39.0
		% within Angkatan	43.6%	56.4%	100.0%
Total	Count	85	38	123	
	Expected Count	85.0	38.0	123.0	
	% within Angkatan	69.1%	30.9%	100.0%	

Crosstab

			soal_12		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	35	10	45
		Expected Count	27.4	17.6	45.0
		% within Angkatan	77.8%	22.2%	100.0%
	2018	Count	28	11	39
		Expected Count	23.8	15.2	39.0
		% within Angkatan	71.8%	28.2%	100.0%
	2019	Count	12	27	39
		Expected Count	23.8	15.2	39.0
		% within Angkatan	30.8%	69.2%	100.0%
Total	Count	75	48	123	
	Expected Count	75.0	48.0	123.0	
	% within Angkatan	61.0%	39.0%	100.0%	

Crosstab

			soal_13		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	24	21	45
		Expected Count	23.4	21.6	45.0
		% within Angkatan	53.3%	46.7%	100.0%
	2018	Count	26	13	39
		Expected Count	20.3	18.7	39.0
		% within Angkatan	66.7%	33.3%	100.0%
	2019	Count	14	25	39
		Expected Count	20.3	18.7	39.0
		% within Angkatan	35.9%	64.1%	100.0%
Total	Count	64	59	123	
	Expected Count	64.0	59.0	123.0	
	% within Angkatan	52.0%	48.0%	100.0%	

Crosstab

			soal_14		Total
			benar	salah	
Angkatan	2017	Count	42	3	45
		Expected Count	33.7	11.3	45.0
		% within Angkatan	93.3%	6.7%	100.0%
	2018	Count	30	9	39
		Expected Count	29.2	9.8	39.0
		% within Angkatan	76.9%	23.1%	100.0%
	2019	Count	20	19	39
		Expected Count	29.2	9.8	39.0
		% within Angkatan	51.3%	48.7%	100.0%
Total	Count	92	31	123	
	Expected Count	92.0	31.0	123.0	
	% within Angkatan	74.8%	25.2%	100.0%	